

Гурба Арчи г.р 08.08.2016г.

Консультация невролога

НЕВРОЛОГ

БУЗ УР «РДКБ №3 УР»
Психоневрологическое
отделение №1
Уд. Ленина/39 Т. 3412-313377

Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии

Жалобы на задержку психо-речевого развития, резкие перепады настроения, неусидчивость

С анамнезом ознакомлена

Неврологический статус: Сознание ясное, на осмотр реакция адекватная. Менингеальные знаки abs. Голова правильной формы. Глазные щели OS=OD. Зрачки средней величины, равные. Фотореакция живая, прямая и содружественная. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. Носогубные складки симметричные. Язык по средней линии. Глубокие рефлексы с рук живые, D=S, с ног оживлены, D=S. Брюшные рефлексы живые, D=S. Патологических стопных знаков нет. Мышечный тонус физиологический. Сила в конечностях - 5 б. Чувствительность не нарушена. Координаторные пробы не выполняет в силу когнитивных нарушений. Походка не изменена.

По ЭЭГ от 2018 г условно-эпилептиформные паттерны

По ЭЭГ от 2020 г: типичной эпилептиформности не обнаружено

По ЭЭГ от 2021 г: Эпилептиформная активность соответствует ДЭПД

МРТ г/м от 2018 г: Умеренная моноventрикулярная гидроцефалия. МР-признаки аденоидов 2 степени

Заключение: Резидуально-органическое поражение ЦНС с формированием моноventрикулярной гидроцефалии по МРТ г/м от 2018 г. в виде синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, общго недоразвития речи, задержки формирования когнитивных функций

Р-но:

-снижение дозы тиоридазина (сонапакс): по 1/2г*2 р/дн – 3 дня, далее по 1/2 на вечер -2 дня, затем отмена

-снижение дозы гидроксизина (атаракс): по 1/4 г*2 р/дн – 3 дня, далее по 1/4г на вечер – 2 дня, затем отмена

-атомоксетин (статтера) 10 мг по 1 капсуле утром во время еды – 14 дней, далее по 2 капсулы утром – 14 дней, далее по 3 капсулы утром – в течение 3 мес

Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии

-далее осмотр неврологом на поддерживающей дозе в 30 мг (3 капсулы) в сутки через 3 мес (т. 31-33-77 добавочный 418).

-при ухудшение общего самочувствия, аллергических реакциях, нарушение сна, усилении возбудимости прекратить прием препарата и продолжить прием гидроксизина 25 мг в дозе 1/2т*2 р/дн

-при непереносимости препарата страттера консультация психиатра для решения вопроса о назначении риполепта.

Штина М.Г.



Дарю ЗАВТРА!
пожелобольным детям Удмуртии