

Осмотр детского ОРТОПЕДА

Пациент: Ильин Григорий Александрович Возраст: 10 лет

Жалобы: на быструю утомляемость, неуверенную походку, боли в пятках, плоские стопы и периодические боли в спине

Объективно:

Телосложение: повышенного питания Положение головы: правильное

Форма головы: норма

Движения в шейном отделе позвоночника: в норме

ходит самостоятельно _

Походка: шаг

Асимметрия высоты надплечий: незначительная ; треугольники талии: симметричные ; грудная клетка: симметричная правильной формы ; нижняя апертура ребер: без особенностей ; нижние углы лопаток: на одном уровне

Линия, проведенная через остистые отростки позвонков: прямая , в грудном и поясничном отделах , в грудном вправо , в поясничном вправо

кифоз грудного отдела норма ; поясничный лордоз норма ; «реберный горб» нет h = см. ; паравerteбральный мышечный валик в поясничной области нет h = см.

ЗВПО: D=S

ПВПО: D=S

Ось верхних конечностей: без отклонений -

Объем движений в суставах верхних конечностей в N, сгибание/разгибание в локтевых суставах без отклонений

Ротация предплечий: не ограничена -

Ось нижних конечностей: без отклонений -

Объем движений в суставах нижних конечностей:

в тазобедренных суставах разведение: без отклонений ; внутренняя ротация бедер: без отклонений ; наружная ротация бедер: без отклонений _ ; сгибание/разгибание в коленных суставах: в норме ; сгибание/разгибание в г/стопных суставах: 150/80 градусов

Оси стоп прямые (справа , слева)

Своды уплощены продольные ; положение пяточных костей физиологический вальгус

Прочее : 1 пальцы стоп отклонены кнаружи (слева 15 градусов, справа 12 градусов). Болезненность при пальпации пяточных костей, ходьба на пятках мало болезненна

Клинический диагноз:

Основной: (M21.4) Синдром Виттевина-Колка. Продольное плоскостопие 2 степени. ФНС 1 степени. Переходный поясничный позвонок S1. Лумбаллизация. Дорзальные протрузии межпозвонковых дисков L4-L5, L5-S1.

Рекомендовано:

1. Лфк.
2. Наблюдение у невролога.
3. Парафин "сапожки" 2 курса №10.
4. Малосложная ортопедическая обувь с выкладкой продольного свода.
5. Корсет пояснично-крестцовый средней степени фиксации.
6. Осмотр ортопедом через 1 год.

Врач: Ибрагимов В. Р.

