



Паддубный Николай Иванович

Возраст 9 лет

Перед МСЭ.

Жалобы мама предъявляет на отставание в моторном, психо-речевом развитии: самостоятельно не ходит, только с поддержкой за подмышечные области, не может самостоятельно сесть, при присаживании сидит с опорой, но кратковременно (до 10-15 минут), затем заваливается набок, ползает по-пластунски, умеет частично раздеваться, одеваться не может, мелкая моторика развита слабо, атетоидные движения в конечностях, кушает самостоятельно только вилкой, речь смазанная, нечеткая, иногда малопонятная для окружающих, периодически поперхивается при проглатывании густой пищи, снижение остроты зрения, косоглазие, физиологические отправления контролирует частично, находится в памперсах. Учится в 1 классе, по адаптивной программе, с предложенной программой справляется. Состоит на «D» учете у невролога. Ребенок - инвалид с рождения.

N.st.: Сознание ясное. Менингеальные знаки abs, голова долихоцефальной формы. ЧМН: глазные щели OD<=OS, расходящийся страбизм, недостаточность конвергенции, парез взора вверх, зрачки D=S, фотореакция сохранена. Носогубные складки асимметричны, гиперкинезы языка, оромандибулярные гиперкинезы, насильственный поворот головы вправо, атетоз в руках (особенно в кистях). Речь - нечеткая, смазанная, говорит простыми фразами, умеренная саливация. Асимметрия высоты надплечий и нижних углов лопаток, С-образное искривление позвоночника, перекос таза. Движения в конечностях ограничены, нейрогенная тугоподвижность голеностопных, тазобедренных, локтевых, плечевых, лучезапястных суставов. СХР с в/конечностей D>=S, оживленные, с ног высокие с клоноидным ответом, грубее справа. Брюшные рефлексы вызываются. Мышечный тонус повышен по пирамидному типу с элементами дистонии, выше в правых конечностях. Мышечная сила снижена: до 3,0 баллов в руках, в ногах 1 балл в стопах, 2 балла в проксимальных отделах. Патологические стопные знаки с двух сторон. Походка (при посторонней поддержке) спастико-паретическая.

DS: Детский церебральный паралич в форме спастического тетрапареза выраженной степени, грубее в правых конечностях (мышечная сила в правых конечностях 1-2 балла, в левых конечностях 2.0 балла), GMFCS III, MACS III, CFCS III, умеренный псевдобульбарный синдром, тазовые нарушения средней степени выраженности по типу недержания мочи, выраженная задержкой моторного развития, умеренная задержка психо-речевого развития, выраженная дизартрия, умеренными глазодвигательными нарушениями, ЧАЗН OU.

Рекомендовано:

- наблюдение невролога, ортопеда, окулиста
- кальция гопантенат 0,5 по 1 таб х 3 р/д (у, д до 16-00 ч) 2 мес
- Абилизация в реабилитационно-абилитационных центрах
- стационарное лечение в неврологических отделениях 1-2 раза в год
- нуждается в адсорбирующем белье (памперсы для детей 3 штуки в день (90 штук в месяц), адсорбирующие пеленки 60x90 см 30 штук в месяц)

Невролог И.Ф. Байбекова

