

Жалобы: слабость в конечностях, нарушение двигательного развития: не переворачивается, не сидит, не ползает, не стоит, не ходит. Игрушки произвольно захватывает не ловко, говорит предложениями, звукопроизношение нарушено. Навыки самообслуживания страдают: ложкой пытается есть, не одевается, не раздевается. Глотает плохо, поперхивается. Функции тазовых органов контролирует.

Нарушение зрения, косоглазие с рождения (ЧАЗН с 2 сторон).

Анамнез: недонопенность 29 недель, РДС, ИВЛ до 01.11.11г, ПВЛ, кистозная деформация.

В 5мес перестал сосать из бутылочки, на ЭЭГ выявлена эпилептиформная активность, было причмокивание, размахивания руками, был назначен конвулекс+ клоназепам. В 4 года препараты отменены, назначен дифенин, с 2020г Зонегран (дифенин постепенно отменен). На данный момент на терапии Зонеграном, приступов нет, на ЭЭГ положительная динамика в виде отсутствия эпилептиформной активности.

ЧМТ - отрицает. Наследственность: не отягощена.

ВЭЭГ сна от 23.01.23г – эпилептиформной активности не выявлено.

Неврологический статус: Менингеальные знаки отрицательные. ЧМН: глазные щели D=S, зрачки равные, реакция зрачков на свет живая. Движения глазными яблоками в полном объеме, расходящееся косоглазие альтернирующее, взгляд фиксирует, следит за предметом. Носогубные складки симметричные. Язык по средней линии в полости рта, высокое небо.

Сухожильные и периостальные рефлексы с рук спастичны, D= S, с ног спастичны, с расширенной рефлексогенной зоной, D=S. Ограничено сгибание и разгибание конечностей, разведение в тазобедренных суставах. Сила в руках и в ногах 2 б.

Мышечный тонус высокий. Гипотрофия нижних конечностей, контрактуры коленных, голеностопных, тазобедренных, локтевых, лучезапястных суставов. Рефлексы орального автомата, р.Бабинского с 2 сторон. Гиперкинезы- дубль-атетоз, гиперкинезы языка. Чувствительность оценить сложно. Речь-подкорковая дизартрия. Походка - не ходит.

Опора с перекрестом на передние отделы стоп. Гипергидроз не выражен. Вес=17,5кг.

Диагноз: ДЦП, GMFCS 5, MACS 5, CFCS 2, спастическая диплегия выраженной степени, умеренный подкорковый синдром, глазодвигательные нарушения, ЧАЗН с 2 сторон, умеренный псевдобульбарный синдром контрактуры суставов конечностей. Кистозная дегенерация вещества головного мозга.

Структурная фокальная эпилепсия, медикаментозный контроль.

Рекомендации:

Оперативное лечение и наркоз не противопоказаны.

Зонисамид постепенная отмена: на ночь 37,5мг 2 недели, затем 25мг на ночь 2 недели, затем 12,5мг на ночь 2 недели, затем отмена.

После оперативного лечения - Баклофен 10 мг по 1/2 таб 1 р/д 1мес.

Магния лактат 470мг + пиридоксина гидрохлорид 5 мг по 5 мл 2 р/д 20 дней. 2 р/год. Левокарнитин 30% по 15 капель 2 р/д 2 мес.

Колекальциферол по 3 капли 1 р/д в осенне-зимний период.

Массаж спины, конечностей №10 4 курса в год. ЛФК ежедневно не менее 30 минут.

Парафинолечение 4-6 курсов в год на голени, стопы.

Контроль офтальмолога, ортопеда, невролога в динамике.

Калимуллина Е.Х.

