

КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА – ЭПИЛЕПТОЛОГА

Джамалов Мухамаджан Валиевич

Осмотр в динамике

Жалобы на беспокойный сон ночью, кричит.

Глазное дно 29.01.2024 – ДЗН бледный, границы стушёваны, отека нет, артерии узкие, вены среднего калибра.

ЭЭГ 29.01.2024 – замедление основной активности, избыточной бета активности.

Эпилептиформной активности не выявлено.

Обследован в РДКБ Казани по поводу рвот – ГЭРБ, рефлюкс-эзофагит. ГПОД.

Железодефицитная анемия.

Впервые обратились в 2022 году с жалобами на рвоты частые, коричневого цвета, независимо от приема пищи. Симптомы появились 2 месяца назад. Сильно похудел последнее время. С рождения наблюдается у невролога по поводу нарушения развития. Судороги с неонатального периода, до октября 2020 года прием вальпроевой кислоты, препарат не принимает с 2020 года.. Запоры выраженные, кал плотный.

Выраженное нарушение психомоторного и речевого развития – не сидит, голову удерживает плохо, ест протертую пищу, речь в виде единичных звуков.

Очень беспокойный сон и часто плачет.

Акушерский анамнез – роды в 35-36 недель весом, Кесарево, Апгар 1-3-5 б баллов. Асфиксия тяжелой степени, ЦИ 3 степени.

МРТ головного мозга 02.07.2021 – выраженные атрофические изменения полушарий ГМ с перивентрикулярной лейкомалиией и смешанной ветрикуломегалией.

Neurology Status: на осмотре на звуки реагирует, улыбается, за предметами следит. ЧМН – глазные щели и зрачки равные, фотопреакции в норме, страбизма нет, носогубные складки симметричные, язык по средней линии, рефлекс с корня языка вызывается.

Мышечный тонус высокий изменён пирамидному типу, выраженный перекрест в ногах.

Рефлексы сухожильные периостальные высокие, симметричные. Симптом Бакинского с 2 сторон. Окружность головы 43,5 см.

Заключение: детский церебральный паралич, двойная гемиплегия тяжелой степени, GMFSC V уровень, тяжелое диффузное нарушение высших корковых функций, микрокрания. Гидроцефальный синдром в стадии субкомпенсации
Инсомнический синдром.

Рекомендовано:

- МРТ головного мозга обзорная от 1,5 Т под седацией
- Ботулотерапия 3-4 раза в год
- Массаж, ЛФК
- Мелаксен 3 мг по ½ таб за 30 минут до сна – 1-3 мес

(Анастасия С.С.)

Невролог, к.м.н.

Пилина Гузель Сергеевна

GUZEL8144@YANDEX.RU

С планом лечения и обследования согласен (а) _____ 05.08.2024