

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА

Дата: 04.05.2020

Возраст: 17 лет

Пациент: Захарова Анастасия Дмитриевна

Жалобы: На невнятную речь, смена настроения (чаще неоправданный смех) или резкая реакция негатива в виде слез, склонность к запорам.

Тошнота: нет

Ч.М.Т. нет

Судороги нет

Обмороки нет

Сон не нарушен

Головокружение нет

Эпилепсия в родстве нет

Неврологический статус:


Рвота: нет

Укусы клещей нет

Носовые кровотечения нет

Энурез во сне нет

Инвалидность нет



Окр. головы: АД-120/80 мм рт ст см. Голова округлой формы; Сознание: ясное; Менингеальные знаки: нет; ?;

Ч.М.Н: Зрачки: равные Реакции на свет: живые; Диплопия: Нет; Нистагм: нет; Страбизм: периодический расходящийся альтернирующий стробизм, грубее слева; Движения глазных яблок: при взгляде в стороны уводит противоположное яблоко вверх (грубее слева); Конвенгенция: ослаблена (грубее слева); Носогубные складки: равны; Глазные щели: симметричные; Язык: девиация языка вправо

Мышечный тонус: с рук: S повышен по пирамидному типу D незначительно повышен с ног: S повышен по пирамидному типу D повышен по пирамидному типу

Сила: с рук: S 2-3,0 б. D 4,0 б.

с ног: S 3-4,0 б. D 4,0 б.

Сухожильные рефлексы: с рук: оживлены с S

с ног: оживлены D=S

Патологические знаки: нет; Подошвенный рефлекс: средней живости S=D; Брюшные рефлексы: средней живости S=D; Координационные пробы: Пальценосовая проба: с интенцией с двух сторон, с промахиванием слева; Интенция: есть; В позе Ромберга: легкая туловищная атаксия; Атаксия: при ходьбе легкая, при разворотах грубая; Походка: спастико-паретическая; Гиперкинезы: есть; Чувствительность: не нарушена; Вегетативная нервная система: не нарушена Масса(кг): Речь: смазана, невнятная, говорит предложениями на бытовом уровне.

Клинический диагноз:

Основной: (G80.9) ДЦП, смешанная форма - спастический левосторонний гемипарез слева, подкорковый синдром, смешанная дизартрия, церебрастнический синдром.


Рекомендовано:

1. Массаж общий №10.
2. Войто-терапия!
3. Пантогам 500 мг по 1/2 т 2 р/д (утр и полдн)-1нед, по 1 т 2 р/д-1нед, по 1,5 т 2 р/д - 2 мес.
4. Мильгамма (комбилипен) 2,0 в/м №10.
5. После пантогама кортексин 10 мг в 2 мл физ раствора в/м №10.
6. После кортексина семакс 0,1% по 3 капл в каждый носовой ход на внутр стенку носа №10.
7. Логопед массаж, занятия с логопедом!
8. Конс КМН Пилиной ГС для проведения диспорта в сгибателях верхней конечности или в "Нейроне".
9. Курсы реабилитации в мед центре ООО "Сакура" в 04.19 г.

Рекомендован повторный осмотр:

Явка через год, контр ЭЭГ бодрст!

Врач: Рамм Е. Л.

С планом лечения ознакомлена и согласна  (Захарова О. В.)