

Низамбиев Тимур Ильфатович.

25.04.2003 г.р.

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии

Жалобы на задержку психомоторного развития. Самостоятельно поворачивается на бок, с живота на спину. Со спины на живот не переворачивается. Сидит у опоры, не стоит, не ходит. Игрушки берёт, больше, правой рукой. Говорит около пяти слов.

Анамнез:

Мальчик от III беременности, II родов. Беременность на фоне ЦМВИ (носитель), ОРВИ в 5-6 недели и в 32-33 недели, диффузного изменения щитовидной железы, проф. вредности (дез. Растворы). В сроке 34 недели преждевременное отхождение околоплодных вод, экстренное кесарево сечение. Родился недоношенный ребёнок, m = 2200 г., l = 49 см.

По Апгар 2 – 5 баллов, к 10 минуте – 6 баллов. Сразу переведён на ИВЛ. (ИВЛ в течении 12 суток). На 10 день жизни переведён в реанимационное отделение РДКБ, г. Ижевск, на 16-й день жизни переведён в отделение новорожденных РДКБ, г. Ижевск.

В состоянии ребёнка превалировала неврологическая симптоматика: синдром угнетения сменялся признаками гипервозбудимости, повысился мышечный тонус. На НСГ (07.05.03) – структура мозга развита правильно. Межполушарная щель до 4 мм. Умеренно расширены боковые желудочки S = 5,5, D = 4 мм. за счет всех отделов. Ткань мозга неоднородна. Сосудистые сплетения симметричные, однородны. Умеренное повышение эхогенности в перивентрикулярных зонах.

Заключение: Эхопризнаки гипертензионного синдрома.

Гипоксические изменения мозга.

НСГ Межполушарная щель 6 мм. Боковые желудочки умеренно расширены за счёт всех отделов. С обеих сторон в перивентрикулярных зонах мелкие кисты. Сосудистые сплетения без особенностей.

Заключение: Эхокартина ПВЛ, гипертензионный синдром.

НСГ Межполушарная щель 4 мм. Передние рога S = 6 мм., D = 44 мм., (03.06.03) III – норма. В перивентрикулярных отделах с обеих сторон – мелкие разнокалиберные кисты, большие слева.

Заключение: ПВЛ. Незрелость. Дилатация межполушарной щели и боковых желудочков.

В лечении получил цефатоксим, амикацин, дексаметазон, магнезии сульфат, дицинон, контрикал, альбумин, актовегин, роцефин, ГОМК, люминал, реланиум, дофамин, глюкоза, 7,5 % КСл, эуфиллин, ККБ, амбробене, низорал, глиатилин, фенибут, триампур, виферон.

Выписан домой 06.06.2003 г. С диагнозом: «Тяжелое перинатальное гипоксически – ишемическое поражение ЦНС, субкомпенсированный гипертензионный синдром, двусторонняя пирамидная недостаточность, ПВЛ с обеих сторон. Реконвалесцент внутриутробной пневмонии. Недоношенность II ст., ранняя анемия недоношенных I ст.

Подари ЗАВТРА!
детям-инвалидам Удмуртии