



Подари ЗАВТРА!

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"



"УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЬЯ
МИНИСТЕРСТВОЛЭН ПИНГЪЭМЪЯНЬЯ
КЛИНИКАЁ НЫЛПИ ЭМЪЯСЬКОННИЕЗ" УДМУРТ
ЭЛЬКУНЫСЬ ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁНЬЯ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ

426054 УР г. Ижевск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 19, тел./факс (3412) 31-08-85, E-mail:
dstom2@mail.ru

Выписка из амбулаторной карты пациента

ФИО Пасынков Марк Сеергевич

Взят на диспансерный учет 23.06.2022г врачом -ортодонтом

Жалобы на эстетическую неудовлетворенность, множественное отсутствие зубов.

Объективно: лицо асимметрично за счет недоразвития нижней челюсти справа. Подбородок смещен вправо. Ушные раковины с обеих сторон имеют неправильную форму. Профиль выпуклый. При пальпации под слизистой оболочкой твердого неба неба определяется костный дефект твердого неба. Целостность слизистой оболочки твердого и мягкого неба сохранена. Укорочена уздечка верхней губы. Отсутствуют 5.5, 5.4, 6.4, 6.5, 7.5, 7.4, 8.3, 8.4 зубы. 2.6 зуб смещен вперед. Развернуты вдоль оси 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 зубы. В стадии прорезывания 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 2.1 зубы. Верхний и нижний зубные ряды двустороннесужены, асимметричны. Ключ окклюзии справа и слева 2 класс по Энгля. Щечные бугры 1.6 и 4.6 зубов расположены в одной плоскости. Щечные бугры 3.6 зуба перекрывают щечные бугры 2.6 зубов. Щечные бугры 2.6 зубов контактируют с жевательной поверхностью 3.6 зуба.

КТ от 01.08.2019г: кт признака ВПР нижней челюсти в виде гипоплазии тела, альвеолярного и венечного отростков справа, хейлосхизис.

Диагноз: Q 87.0 Синдромы врожденных заболеваний, влияющих преимущественно на внешний вид лица. Синдром I-II жаберных дуг. Синдром Гольденхара? Синдром Пьера-Робена. ? Скрытая расщелина неба. Формирующаяся дистальная окклюзия. Формирующаяся двусторонняя палатиноокклюзия. Двустороннесуженный асимметричный верхний зубной ряд. Двустороннесуженный асимметричный нижний зубной ряд. Тортоаномалия 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 зубов. Мезиальное положение 3.6 зуба. Вторичная адентия 5.5, 5.4, 6.4, 6.5, 7.5, 7.4, 8.3, 8.4 зубов. Короткая уздечка языка

Рекомендовано:

1. наблюдение у ортодонта каждые 3 мес, ортодонтическая коррекция прикуса
2. оперативное лечение (пластика уздечки языка, уранопластика ?)
3. наблюдение педиатра (подготовка к оперативному лечению, выявление сопутствующей патологии и ее коррекция)
4. консультация генетика

Врач-ортодонт Зайцева М.П.

врач-хирург стоматолог Ильина М.М.

24.08.2022г



Подари ЗАВТРА!
Тяжелобольным детям Удмуртии