

Пациент ПЕТРОВ ПЛАТОН ЮРЬЕВИЧ

находился на стационарном лечении в отделении: Невр.отд. кр.\сут.преб. с 11.09.2018 по 21.09.2018

Адрес регистрации:

Поступил в плановом порядке.

ДИАГНОЗ при поступлении: G93.8 Выраженный астено-гипердинамический синдром, сенсомоторная алалия выраженная, как следствие перинатального поражения ЦНС.

ЖАЛОБЫ: На гиперактивность, неусидчивость не говорит, 2-3 слова, обращенную речь понимает в ограниченном объеме, на простом бытовом уровне, избирательный аппетит, ест коробочные каши, привычную пищу от новой пищи отказывается.. Горшком не пользуется. Спит хорошо, засыпает быстро.

Болен с 12 мес

Наблюдается у невролога , посещает специализированный детский сад

Получал лечение за последние 6 мес кортексин , магне В 6 в июле 2018 года, пантогам, эйфорез с зуфиллином на воротниковую зону Динамики нет Поступает с целью обследования и лечения первично

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ: Ребенок от 3 беременности 2 родов.Беременность протекала на фоне УПБ , ОАА (бесплодие 10 лет), анемия 1 ст, поздняя в 13 нед, миома матки , косое положение плода .роды : вые в _39-40_ нед. путем кесарева сечения ,1 пер.- ___, 2пер. - ___, быводн-____, воды-свтл-____, занка по шкале Алгар - __8-8__ баллов .Масса при рождении - 3760 ___ гр.,рост- 54___ см., первое прикладывание к груди в 1 сутки .Состояние после рождения удовлетворительное . Выписан после роддома домой с ДЗ: Здоров .Кормление грудью до 3 лет

Моторное и психическое развитие ребенка : держит голову-2 мес , переворачивается -- 4 мес, сидит- 7 мес,стоит- 10 мес, ходит- 1 год 1 мес .берет предметы в руку- 5 мес,первые слова- нет мес, фразовая речь -нет год Эпидемиологический анамнез: бло , вензаболевания и туберкулез отриц

Перенесенные заболевания:ОРИ не частые , эпиприступы отриц , ЗЧМТ отриц , ветряной оспой не болел

Профилактические прививки:по возрасту-- Аллергологический анамнез: бло ,Генеалогический анамнез не отягощен

В семье 2 детей :старший здоров

Вредные привычки у родителей нет

ДИАГНОЗ заключительный клинический: G93.8 Выраженный астено-гипердинамический синдром, сенсомоторная алалия выраженная, задержка формирования когнитивных функций, как следствие перинатального поражения ЦНС. F79.18

Сопт: Ангиопатия сетчатки с признаками внутристепенной гипертензии. Плоско-вальгусная установка стоп. Синдром генерализованной гипермобильности.

ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ в СТАЦИОНАРЕ ПРОВЕДЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ:пирацетам, глицин, сонапакс

ПРОВЕДЕНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

13.09.2018 Транскраниальная ультрасонография (ТУС)

VT - 4 мм

MS - 71 мм

MD - 72 мм

VLD - 12 мм

VLS - 15 мм

Височные рога боковых желудочков:

S - 3/51 мм

D - 2/50 мм

Межполушарная щель: - мм

Субарахноидальные пространства - мм-

Заключение: Ус картина без клинически значимых изменений

13.09.2018 Электрокардиография (ЭКГ)