



Консультативное заключение №
Центр контроля зрения "ЛинзОчки" -
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46. Тел. 70-90-90

Пациент: Набиуллин Сабир Рамисович

Дата осмотра: 30.06.2024.

Жалобы: На отклонение глаз к носу постоянно, носит очки +0,25-1,50 ах 175/+0,5-1,50 ах 180

Развитие заболевания: Носит очки около 2 лет. проводит исключительно попеременную

Перенесенные заболевания: На учете у невролога ДШП

Эпиданамнез:

Аллергологический анамнез:

Наследственность:

Объективные данные: В/О (V) 0,8/0,8

ВГД: OD = OS =

ВГД (пальпаторно) норма

	Visus без коррекции	Сфера	Цилиндр	Ось	Visus с коррекцией	Кератометрия	ПЗО мм	Пахи мкм	ВГД (ИГД-02) мм.рт.ст.
Правый глаз	0,4								
Левый глаз	0,4								

Аutoreфрактометрия:

Без циклоплегии

На фоне циклоплегии

	Сфера	Цилиндр	Ось	Сфера	Цилиндр	Ось
Правый глаз	-0,5	-1,5	176	+1,00	-1,00	173
Левый глаз	-0,5	-1,75	8	+1,00	-1,00	180

Скиаскопия с узким зрачком/на фоне циклоплегии:

Правый глаз:	Левый глаз:	Правый глаз (широкий зрачок):	Левый глаз (широкий зрачок):
Mi 1,50	Mil,50	Mil,00	Mil,00

Hml,00	Hml,00	Hml,00	Hml,00

ЗОА:

Тест Уорса (Белостоцкого): с 5м монокулярный с доминантным правым глазом

Тест Шобера: Отрицательный

Оценка бинокулярной функции на программе Фокус

Оси глаз: угол 15 град к носу, вертикаль вверх 3 град установка к виску визуальтернирует. Гиперфункция вн. прямой + нижней косой м-цы. Объем движений не ограничен

БМС, офтальмоскопия правый глаз:

Слизистая чистая, отделяемого нет. Роговица средней величины, прозрачная, чувствительность высокая. Передняя камера средней глубины, водянистая влага прозрачная. Радужная оболочка рисунок четкий. Зрачок реакция на свет живая, круглый, диаметр 3 мм. Рефлекс розовый. Хрусталик прозрачный. Стекловидное тело прозрачное.

Офтальмоскопия глазного дна:

Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие. размер нормальный. Макулярный рефлекс выражен. Артерии сетчатки нормального калибра. слегка извиты. Вены сетчатки нормального калибра. слегка извиты. А:В = 2:3. Сетчатка

прозрачная.

БМС, офтальмоскопия левый глаз:

Слизистая чистая, отделяемого нет. Роговица средней величины, прозрачная, чувствительность высокая. Передняя камера средней глубины, водянистая влага прозрачная. Радужная оболочка рисунок четкий. Зрачок реакция на свет живая, круглый, диаметр 3 мм. Хрусталик прозрачный. Стекловидное тело прозрачное.

Офтальмоскопия глазного дна:

Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы четкие, размер нормальный. Макулярный рефлекс выражен. Артерии сетчатки нормального калибра, слегка извиты. Вены сетчатки нормального калибра, слегка извиты. А:В = 2:3. Сетчатка прозрачная.

Диагноз основной: Диагноз: [H50.0] Сходящееся содружественное косоглазие

Описание: содружественное сходящееся неаккомодационное альтернирующее косоглазие с вертикальным компонентом, смешанный астигматизм степ в 2,00. Дисбинокулярная амблиопия слабой степени обоих глаз

Классификация: Основное заболевание

Рекомендации:

очки постоянно дпр 52 мм +0,5 -1,50ax175 призма 8 оси 180\+0,50-1,50ax180 призма 8 осн 0

окклюзия I\I на 2 часа

ВКА Т(актив) №10

ЦИТ(красн) №10

С результатами обследования о состоянии органа зрения и планом лечения ознакомлен(а) и согласен(а). Заключение выдано на руки.

Врач:



Шеретобитова Антонина Витальевна

30.06.2024

Подарц ЭНДПР!
тяжелобольным детям Удмуртии