

индивидуальная лечебная гимнастика с использованием тренажера Галилео, транскраниальная микрополяризация.

На фоне лечения состояние с положительной динамикой - уменьшение мышечного тонуса, увеличение объема активных движений в конечностях.

Выписывается домой под наблюдение невропатолога, педиатра по месту жительства.  
Контактов с инфекционными больными в отделении не было.  
Результат лечения: улучшение

#### РЕКОМЕНДОВАНО:

- Продолжить прием противосудорожной терапии:
    - вальпроевая кислота в гранулированной форме (депакин-хроносфера 250 мг утром, 300 мг вечером),
    - петитимид 200 мг утром, 200 мг вечером,
    - добавить к терапии осеполот 25 мг x 2 раза длительно, *37,5 мг x 2 раза*
  - 2. Занятия с дефектологом, логопедом, логопедический массаж,
  - 3. 1 курс:
    - элькар 30% 0,5 мл x 3 раза 1,5 мес.,
    - нейромультивит 1/2 т. x 2 раза 1 мес.,
  - 4. 2 курс (через 1 мес.):
    - омега - 3 500 мг x 1 раз 3 мес.,
    - лецитин 1/2 чайн.ложки x 2 раза 2 мес.,
  - 5. 3 курс (через 1 мес.):
    - пантогам сироп 1 мл (100 мг) утром 7 дней, 1 мл (100 мг) x 2 раза утром и днем до 1.5 мес.,
    - кудесан 7 кап. x 2 раза 1.5 мес.,
  - 6. Плавание (разрешено плавание в бассейне),
  - 7. Массаж расслабляющий, ЛФК,
  - 8. Медотвод от прививок на 6 мес.,
  - 9. ВЭЭГ во время сна через 6 мес.,
  - 10. Вигантол 2 капли с сентября по май.
- Повторная госпитализация в НХО РДКБ 29.09.2019 г. по ВМП.

Зав. отделением:

Лечащий врач:

Врач эксперт:

Пальм В.В.

Рассказчикова И.В.

Брюсова И.Б.

