



Ребенок Хохряков Тимур Андреевич

Жалобы в настоящее время на нечеткость речи , речь в полном объеме, стихи учит с трудом 4 строчки. Трудности при написании диктантов
Когнитивные нарушения –средней степени . Страдает память , с трудом запоминает информацию.
Цикличность мышления. Эмоционально крайне лабилен. Трудности с контролем поведения .
Гипердинамичность, неусидчивость, снижение концентрации внимания .
Трудности с мелкими движениями – с трудом застегивает пуговицы, почерк страдают соединения соединении букв, при длительной ходьбе устают ноги . Подергивание правой ноги.
Сон хороший . Аппетит хороший .

Неврологический статус: На осмотр реагирует негативно , гипердинамичен, просьбы выполняет не с первого раза . Голова круглая . По средней линии

Черепно-мозговые нервы: Зрачки несколько расширены, симметричны. Реакция на свет, как прямая , так и содружественная живые, симметричные. Язык по средней линии, носогубные складки симметричные. Лицевая мускулатура симметричная.

Мышечный тонус близок к физиологическому, несколько повышен в ногах по пирамидному типу с обеих сторон ,симметричен. Сухожильные рефлексы средней живости, симметричные (0,5). Мышечная сила в конечностях- руки- 5, ноги -5 баллов. Патологических знаков -отрицательных рефлексов в норме . Координаторные пробы в норме. В позе Ромберга устойчив . Асимметрии плечевого пояса нет . Тазовые расстройства-нет . Чувствительность не нарушена.
Вегетативная сфера лабильная, больше по парасимпатическому типу. Походка не изменена .

МРТ головного мозга 26.05.22 единичные мелкоочаговые глиозные изменения вещества мозга резидуального характера

ЭЭГ: диффузные изменения БЭА мозга , тета диапазон выше возрастной нормы

Заключение: Резидуально-органическое поражение цНС (единичные мелкоочаговые глиозные изменения вещества мозга), нарушение формирования когнитивных функций , эмоционально-волевые нарушения , выраженный гипердинамический синдром с дефицитом внимания.
Двусторонний пирамидный синдром.

Рекомендации:

2. Депакин хроносфера 250 мг x1 раз вечером постоянно до следующего осмотра

3. Аминофенилмасляная кислота 0,25 по 1/2x2 раза в день 2 мес

На фоне приема препаратов

4. Котексин 10 мг в/м x1 раз 10 дней

Затем

5. Фенотропил 0,1 по 1/4 т x2 раза 1 мес

6. Наблюдение невролога и психиатра.

