

На фоне болезни Саварот подер-
живаю, во время болезни



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СЕТЬ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК «ДОКТОР ПЛЮС»

Адрес: г. Ижевск, ул. Советская, 38; ул. Молодежная, 40; ул. Пушкинская, 116; ул. 10 лет Октября, 17а;
ул. Петрова, 6; ул. Короткова, 23; ул. Клубная, 48; ул. 7-я Подлесная, 71. Тел.: 60-11-11.
Ижевск, ул. Короткова, 23
Лицензия № 19-01-002607 от 26.12.2018
ОГРН 104180002228
7 (341) 60-11-11

Медицинское заключение

ПУЛЬМОНОЛОГ

ФИО Курмеев ТТродим, 1г. 4 мес.

Дата осмотра: 28/11/19.

Жалобы: Д'осмотр в 1 дозу пульмикорт до 0,5 мг
в П ОРВИ, бронхит (аэроаэрозоль + беродуал + преднизолон) —
гомеопатия — доб-м декаметазона + эуфиллин 2г (мг) + адреналин

Объективный статус: T₃₆ = 37,5, одышка, кашель — одышка + к-
шель (нашар, пульмикорт 0,5 2р/день + беродуал)
сейчас видна перемени на под-уро терапии!
Будемит 0,5 мг/ар, кашель преднизолон (но часто
кониго мочурт, до 10 раз в день).

Состояние соответ-ет основному заболеванию,
видимых признаков одышки нет. Отмечается блед-
ность кожных покровов. Носовое дыхание
свободное, зев розовый, глотка свободной.

Перкуторный звук ясной мелочной фонит-
ные пузырьчатые, но протудан выдох удли-
нены. Тоны сердца чистые ритмичные.

Диагноз: рек-м ОРВИ, фронтосинусит,
диспнея, плевральная экссудативная
гематома ДН I ст. Вне опасности. Аспири-
циновой смидрон?

- Рекомендовано
- 1) беродуал отменить, перейти на амбробен 8 кап. + пульмикорт 0,25 мг 1м + 1м 2р/день x 2р/день — 14 дней
 - 2) с 12/11 амбробен отменить, пульмикорт оставить 0,25 мг 2м (можно не разводить) 1р/день — ещё 2-4 недели, затем при стаб-м состоянии перейти на 0,25 мг 1м в 1м 2р/день — 3 мес.
 - 3) заманировать цитодавил 1г/сут
 - 4) наблюд в диспанс.
 - 5) ПУР крови на цмвз, ВЭФ, ВТЧ бтис

Врач Валентина
БРАТОВА