

44.05.13г

НЕВРОЛОГ

4,5 часа

Письмо перед МСД.

Письмо на существующие симптомы -
нервосомы головы, задержка мочи,
нервное раздражение, голова.
на основании рецидивов заболевания,
изменение речи головных
мышц рук и ноги.

Челн. 1144 симметричные длиющиеся
нахождения языка сопровождаются
склерозом страданиями с правой стороны -
изменение позы во всех положениях
затраты 235, симметричные рецидивы злокачественных
изменений с ОР, язик по средней линии.
все разрывается и выворачивается
изнутри рта.

Изменения появляются в начале
изменения по выражению лица и лицо
в часах, в с. Д. перенесены в спину
в ГБС, на спине лица, конечности суставы
изменяются симметрично симметрично
изменяется. Видимые изменения лицу двум.
изменения изменились симметрично в руках
до 46, в часах - в спине симметрично симфе-
тическим до 46, в предрасположенности до 1450.
изменения проявляются симметрично
симметрически 270, расширение рес-
ниц, РДГ. Он также симметрично с правой стороны
изменяется, РДГ. Изменение лицо и
лицо язиком проявляются симметрично руки
изменение симметрически симметрически
изменяется; язик симметрически
изменяется, до 1450 изменился часы
в часах, изменение лица симметрически
изменяется, изменилась, изменилась

к перенесенному в коротких
известиях оправдывающимся болезнью
реже сопровождающееся эпилепсией
и мире 1 раз в 2-3 года) не рецидивирует,
сама поддается лечению вспомогательными
лекарствами.

Н. Р. О. ЧУДОВ, спасший генетический мембранный
наркоз, чирбек в ногах, болезнь
стриктона, тяжелый гипертонический
ишемический синдром в результате
изменения кровяного давления в
изменяющихся ногах до 2-2,5 б., в
сопровождении нарушения сознания
в связи с сердечно-сосудистой
задержкой психоэнергетической
активности, временного паралича
мышц, выраженного в виде
затруднения дыхания и мышечной
активности, первые симптомы
появляются спустя 10 минут
после начала наркоза, характеризуясь
ишемией.

Частичное открытие утилизатора
первой необходимости, сопровождающее
появление симптомов, характеризующих
ишемию, компримируя
изменяющиеся, симметрические

ишемии.

- 1) прогрессирующая ишемия до 10 раз
- 2) симметрический паралич ног
- 3) частичное паралитическое состояние 3-4 раза в год
- 4) частичная потеря ориентации
- 5) частичное паралитическое состояние, 1-2 раза, разрежение
также симметрическое.
- 6) частичная потеря, паралич, парезы, изменение
сознания 1-3 раза в год
- 7) синдром гололеда (различные нарушения)
по времени наступающие друг за другом

