

Жалобы: нарушена коммуникация со сверстниками и окружающими детьми, эмоциональная и поведенческая нестабильность, эпизоды выраженной эмоциональной лабильности, агрессивности, стереотипные действия. Затруднено выражение эмоций, поведенческие реакции, неусидчивость, быстрое переключение, нарушен сон. Моторная неловкость.

Речь развита, навыки самообслуживания развиты. Речь развита с 4 лет.

МРТ головного мозга от 18.02.201г – симметричные участки энцефаломалии перивентрикулярных отделов, немногочисленные очаги в белом веществе головного мозга, асимметрия позвоночных артерий.

ЭЭГ сна от 2020г- патологической активности не выявлено.

Наблюдается психиатром –синдром Аспергера.

Неврологический статус: астенического телосложения. ЧМН: Лицо симметричное.

Зрачки S=D. Реакция на свет живая. Нистагма нет. Глазные щели S=D. Оси глаз параллельные. Движения глазных яблок в полном объеме. Носогубные складки S=D. Язык по средней линии. Фонация не нарушена.

Мышечный тонус диффузно гипотоничен, S=D. Сила мышц 5 баллов. Сухожильные рефлексы равные, живые. Патологические рефлексы – нет. Опора –вальгирует стопы. Гиперкинезов нет. Чувствительность не нарушена. Вегетативная система не нарушена. Моторная неловкость.

Диагноз: Синдром Аспергера, эмоционально-поведенческие реакции, синдром дефицита внимания с гиперактивностью на фоне резидуальной энцефалопатии, незавершенная миелинизация перивентрикулярных отделов, немногочисленные очаги в белом веществе головного мозга.

Рекомендовано:

Направить на МСЭ.

Наблюдение психиатра, поведенческая коррекция.

Когнитивно-поведенческая терапия.

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин 0,1% по 2 капли в каждый носовой ход 1 р/д 1 мес.

Магния лактат + пиридоксина гидрохлорид по 1 ампуле внутрь 1 раз в день 20 дней (или по 1 таб 2 р/д 1 мес).

Наблюдение по месту жительства.

Калимуллина Е.Х.

